



Les vaccins antityphoïdiques conjugués (VTC) :

- Offrent une protection efficace contre la typhoïde pendant au moins 4 ans.
- Sont administrés en une fois.
- Conviennent aux enfants à partir de 6 mois.
- Peuvent être intégrés dans les programmes de vaccination infantile de routine
- Peuvent être co-administrés avec d'autres vaccins infantiles de routine.



Les VTC préqualifiés sont sans danger et efficaces :

- Les études d'efficacité de phase 3 montrent que le VTC est efficace dans 79 à 85 % des cas de typhoïde chez les enfants vaccinés en Afrique et en Asie.
- Les études d'immunogénicité sur le TYPHIBEV® montrent une réponse immunitaire comparable à celle du VTC Typhbar.
- Les VTC ont été administrés en toute sécurité à environ 150 millions d'enfants dans le cadre de campagnes de vaccination.



L'Organisation mondiale de la Santé encourage :

- Introduction prioritaire des VTC dans les pays présentant la plus haute prévalence de la typhoïde ou une pharmacorésistance élevée.
- Administration programmatique en même temps que les autres vaccins prévus à l'âge de 9 mois ou entre 1 et 2 ans, suivant le calendrier de vaccination national.
- Campagnes de rattrapage jusqu'à l'âge de 15 ans.
- Usage en réponse aux flambées confirmées de typhoïde.



L'usage plus répandu des VTC peut :

- Réduire le besoin d'antibiotiques.
- Ralentir l'émergence d'autres souches pharmacorésistantes.
- Réduire la prévalence de la maladie.
- Sauver des vies.